

يمكن أن تؤدي متغيرات الفيروسات الجديدة التي تنتشر بسهولة أكبر إلى ارتفاع سريع في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19

الآن، أكثر من أي وقت مضى، من المهم إبطاء انتشار الفيروس

تتغير الفيروسات باستمرار من خلال الطفرات، ومن المتوقع ظهور أنواع جديدة من الفيروسات بمرور الوقت.



من المعروف أن الفيروس الذي يسبب الكوفيد-19 يكتسب، في المتوسط ، طفرة واحدة جديدة كل أسبوعين.



قد تكون بعض المتغيرات أكثر قابلية للانتقال أو أقل إستجابة للقاحات - لذلك من المهم تجنب التعرض للفيروس.




يجب على الأشخاص الذين يسافرون إلى ولاية ميشيغان وأولئك الذين ربما تعرضوا للفيروس المتغير الجديد القيام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا (بدون خيار إنهاء الحجر الصحي مبكرًا) وإجراء الإختبار أيضًا.



إرتد كمامة
إرتد كمامة يمكن ارتداها واقية للوجه فوق الكمامة لمزيد من الحماية




إبق على بعد 6 أقدام على الأقل



تجنب التجمعات في الأماكن المغلقة



قم بإجراء الإختبار



إحصل على اللقاح عندما يكون ذلك متوفرًا لك

